

BOLETIN INFORMATIVO

Núm. 11 – Diciem. 1994

ESTE MES

Semilleros de repollo para verano

La correcta aplicación de diferentes técnicas de cultivo: semillero, elección de variedades, fertilización, riego, control de plagas, enfermedades y malezas, constituyen los aspectos básicos que hay que tener en cuenta para rentabilizar el cultivo del repollo y mejorar su producción en Asturias. Esta puede alcanzar rendimientos superiores a las 30 toneladas por hectárea, con posibilidades de ofertar al mercado un producto de buena calidad durante casi todo el año. En este artículo nos vamos a referir a la producción de repollo para comercializar desde finales de mayo a finales de agosto.

Semillero

Los semilleros se efectuarán a finales de diciembre o principios de enero para trasplantar a finales de febrero o a principios de marzo.

Es imprescindible proteger los semilleros de temperaturas inferiores a 7°C para que los repollos de verano tengan mayor resistencia al espigado. Por tanto, el semillero se realizará en invernadero, cubriéndolo las noches con riesgo de heladas con un plástico tipo EVA o con manta térmica.

Se recomienda efectuar la siembra sobre cepellones prensados en máquina o en bandejas de poliestireno con alvéolos. Al efectuar el trasplante con cepellón, se garantiza el arraigado de las plantas y se mejora la precocidad y el rendimiento del cultivo, en comparación con la realización de semilleros tradicionales y su posterior trasplante a raíz desnuda. Como sustrato se utilizará una turba negra de las habituales para lechuga.

Variedades

El mercado regional demanda especialmente los repollos de hoja

rizada (coles de Milán) o de hoja abullonada de forma picuda.

Para que la recolección sea escalonada, se recomienda efectuar la plantación con tres grupos de variedad de distinto ciclo:

- **Salarite:** Período de recolección corto (si se alarga el corte, revienta para iniciar el espigado). Ofrece la posibilidad de iniciar el mercado de primavera con un repollo de buena calidad, de 1,3 a 1,5 Kg por pieza.
- **Wondergem / Mascote / Savoy Monarch:** Alargan la producción hasta el mes de julio con piezas de calidad y unos 2 kg de peso medio.
- **Savoy Prince:** Prolonga el período comercial hasta finales de agosto.

Una distribución orientativa de estas variedades para lograr una recolección escalonada sería del 20% de *Salarite*, 30% de *Wondergem* o *Mascote* o *Savoy Monarch* y 50% de *Savoy Prince*, respectivamente, del total de la superficie a plantar. Si se optara por una recolección única, se elegiría la variedad de la época de comercialización deseada. En general, las de ciclo medio (*Wondergem*, *Mascote* y *Savoy Monarch*) o largo (*Savoy Prince*) se muestran como las más favorables.

Marco de plantación

- Separación entre líneas: 70-90 cm.
- Separación entre plantas: 45 cm. para *Salarite*, y 50-60 cm. para el resto de las variedades.

Estos marcos suponen una densidad de plantación de 20 a 25 mil plantas por Ha, para lo cual se precisan unos 150 gramos de semilla.

Las técnicas de cultivo referentes a preparación del terreno, abonado, control de malezas, plagas y enfermedades se abordarán próximamente en la sección técnica.