

### ESTE MES

### Poda en verde de árboles frutales

La poda en verde se realiza entre el comienzo de la vegetación en primavera y la caída de las hojas en otoño, tanto en los frutales de pepita y hueso como en el kiwi y pequeños frutos. Su interés se centra fundamentalmente en:

- Favorecer la aireación e insolación de los árboles.
- Limitar la difusión de enfermedades y plagas al eliminar los brotes afectados.
- Mejorar el equilibrio del árbol evitando la competencia de las ramas superfluas con las necesarias.
- Reducir la intensidad de las podas de madera en el invierno.

#### ***Poda en verde de árboles jóvenes***

En los árboles jóvenes, es decir, en el período de formación, la poda en verde en la primavera permite:

- Suprimir los brotes que salen con ángulos muy cerrados y los que compiten con la prolongación de las ramas del año anterior.
- Provocar la salida de brotes anticipados si es necesario.
- Eliminar la competencia de los chupones cortándolos sobre la base o dejando una o dos yemas si se desea lograr brotes menos vigorosos.

#### ***Poda en verde de árboles adultos***

Las operaciones más importantes de poda en verde de árboles adultos son las siguientes:

• **Corte de brotes en la cima de los árboles.** En variedades con gran tendencia al desarrollo apical se cortan algunos brotes de la cima en junio. Posteriormente saldrán brotes más débiles y tendentes a formar yemas de flor. Suele ser suficiente efectuar esta operación dos años seguidos.

• **Corte de Chupones.** Para facilitar la insolación de los frutos, se cortarán los chupones que crecen en el dorso de las ramas horizontales, sobre todo en variedades cuyos frutos colorean con dificultad ('Jonagold', 'Elstar' y otras variedades de manzano). Estas podas se efectúan desde finales de junio hasta dos semanas antes de la recolección. Si hubiese muchos chupones, se aconseja realizarlas de forma escalonada.

**Melocotonero y cerezo.** Suprimir durante la primavera-verano los chupones y brotes vigorosos que proliferan en los extremos de las ramas laterales ("escobas") y en la parte alta del árbol ("cabezas de sauce"). Después de la recolección cortar las ramas que dieron fruta en el melocotonero y las envejecidas en el cerezo.

**Kiwi.** Cortar chupones, extremos de brotes que se enroscan y despuntar las ramas de crecimiento indeterminado más próximas al suelo.

**Frambueso y zarzamora.** Tras la recolección, cortar al ras del suelo las cañas del año anterior que ya produjeron

**Grosellero.** Se aclaran las ramas que impiden la llegada de los rayos solares al centro del arbusto. En el grosellero rojo, se despuntan algunos brotes, a tres o cuatro yemas, para obtener madera de renovación. □