HOJA DIVULGATIVA 3/92

PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONSEJERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA

LA PRODUCCIÓN DE COLIFLOR EN OTOÑO ES RENTABLE.

El cultivo de la coliflor se adapta satisfactoriamente a las condiciones ecológicas de Asturias, ofreciendo la posibilidad de conseguir rendimientos productivos de 30-40 t por ha.Las condiciones de mercado más favorables actualmente se centran desde Septiembre a Noviembre, época en la que el precio medio de venta puede alcanzar, en mercado mayorista, las 75 ptas /kg.

RECOMENDACIONES

VARIEDADES.- Siria, Aviso, Nautillus, Candid Charn y Serrano consiguen producciones y calidad de inflorescencias destacadas. Iniciando la producción antes de los 130 días desde la fecha del semillero.

CALENDARIO.- El semillero se realizará entre finales de Mayo y finales de Junio, de una sola vez o de forma escalonada, con lo que se cubrirá un calendario de comercialización de finales de Septiembre a finales de Noviembre. El trasplante debe de efectuarse a los 30-35 días desde la fecha del semillero.

ABONADO.- En las labores preparatorias se incorporará, salvo que el análisis correspondiente imponga otras recomendaciones, 350 kg de Superfosfato de cal, 300 kg de Sulfato de potasio y 200 kg de sulfato de magnesio por ha. Antes de plantar se aportarán 250 kg/ha de sulfato amónico. El abonado se completará con dos aportaciones de nitrato amónico cálcico, a razón de 100 kg/ha cada una de ellas, la primera a mediados de Agosto y la segunda a principios de Septiembre.

CONTROL DE MALEZAS.- Con las plantas arraigadas, a los 15 días del trasplantes se efectúa un tratamiento herbicida con Clortal, 35% + Propacloro, 35% P.M. a dosis de 10 kg/ha. A mediados de Agosto realizar labor de motoazada entre calles.

MARCO DE PLANTACION.- de 0.80 a 1 m entre calles y de 0.60 a 0.45 m entre plantas (20 a 25 mil plantas por ha).

RIEGO.- La disponibilidad de agua (sobre todo después del trasplante, a continuación del herbicida y durante el mes de Agosto) es imprescindible, por lo que hay que prever la dotación de riego.

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES.- A lo largo del cultivo (semillero y campo) se realizarán 4-5 tratamientos con los fungicidas: cobre+cimoxalino, mancoceb+cimoxalino, metalaxil y mancoceb, complementados con insecticidas para el control de gusanos del suelo y orugas (clorpirifos, cipermetrina u otros).

OBSERVACIONES

Las materias activas señaladas tienen en el mercado los siguientes nombres comerciales:

- Clortal, 35% + Propacloro, 35 P.M.
- Cobre + Cimoxalino
- Mancoceb + Cimoxalino
- Metalaxil
- Mancoceb
- Clorpirifos
- Cipermetrina

Recomendaciones extraidas de la Información Técnica nº 5/92: COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES DE COLIFLOR PARA COSECHAR EN OTOÑO. Miguel Angel Fueyo Olmo, Alberto Baranda Alvarez, Atanasio Arrieta Illumbe. Instituto de Experimentación y Promoción Agraria . (Villaviciosa).